

# Die Aufhängungssysteme des Dünndarms

## • Anatomische Lage des Dünndarms

- Allgemeine Position:
  - Der Dünndarm erstreckt sich vom Magenausgang (Pylorus) bis zur Einmündung in den Dickdarm (Caecum).
  - Er ist in der Bauchhöhle zentral gelegen und nimmt den Großteil des Peritonealraums ein.
  
- Abschnitte des Dünndarms:
  - Duodenum (Zwölffingerdarm):
    - Lage:
      - C-förmig und retroperitoneal, umschließt den Kopf der Bauchspeicheldrüse.
    - Peritoneale Relationen:
      - Der größte Teil ist sekundär retroperitoneal fixiert.
      - Nur der Anfangsteil (Pars Superior) ist intraperitoneal.
      - Der Duodenum-Abschluss (Flexura Duodenojejunalis) wird durch das Ligamentum Treitz an der hinteren Bauchwand befestigt.
  
  - Jejunum (Leerdarm):
    - Lage:
      - Im oberen linken Quadranten des Abdomens.
    - Peritoneale Relationen:
      - Vollständig intraperitoneal.
      - Mit dem Mesenterium (Gekröse) an der hinteren Bauchwand befestigt, was seine hohe Beweglichkeit ermöglicht.
  
  - Ileum (Krummdarm):
    - Lage:
      - Im unteren rechten Quadranten des Abdomens, endet an der Ileozäkklappe (Übergang zum Dickdarm).
    - Peritoneale Relationen:

- Vollständig intraperitoneal und durch das Mesenterium beweglich.